

Eisenmangel bei Kindern

- mit Hinweisen für eine optimale Eisentherapie -



Das Eisen, das den Magen schont

ferro sanol® duodenal

Wirkstoff: Eisen (II)-glycin-sulfat-Komplex



www.ferro-sanol.de



Hinweise für eine optimale Eisentherapie

Für Säuglinge und Kleinkinder sind wegen der genauen Dosierung FERRO SANOL® Tropfen am besten geeignet. Ab 6 Jahren sollten Kinder die gut verträglichen FERRO SANOL® DUODENAL oder FERRO SANOL® DUODENAL MITE Kapseln einnehmen.

Es ist sehr wichtig, dass Eisenpräparate regelmäßig und ausreichend lange eingenommen werden. Bitte halten Sie sich an die Empfehlung Ihres Arztes oder Apothekers bzw. der Gebrauchsinformation.

Eisenpräparate sollten möglichst nüchtern mit Wasser oder Orangensaft eingenommen werden.

Achten Sie auf eine ausgewogene eisenreiche Ernährung mit Fleisch und Gemüse. Zusätzliches Vitamin C (Zitrusfrüchte) fördert die Eisenaufnahme in den Körper.

Meiden Sie besonders schwarzen Tee, Kaffee, Milch und Limonade als direktes Einnahmegetränk. Darin sind Substanzen enthalten, die sich störend auf die Eisenaufnahme auswirken.

Während der Eisentherapie kann eine leichte Verstopfung und ein schwarzgefärbter Stuhl auftreten. Eine Stuhlverfärbung ist harmlos und geht nach Therapieende wieder weg. Bitte brechen Sie die Therapie deshalb nicht ab.

Bei einer Eisentherapie können leichte Magenbeschwerden auftreten. Beenden Sie deshalb möglichst nicht vorzeitig die Therapie. Besserung bringt auch oftmals die Einnahme der Eisenmedikamente zusammen mit den Mahlzeiten. Dadurch verlängert sich allerdings die Therapiedauer.

Gelegentlich wird eine reversible Verfärbung des Zahnbereiches durch eisenhaltige dunkle Ablagerungen beobachtet. Diese Ablagerungen sind unbedenklich.

Bei Schluckbeschwerden können die FERRO SANOL® DUODENAL oder FERRO SANOL® DUODENAL MITE Kapseln geöffnet und die darin enthaltenen Kügelchen mit reichlich Flüssigkeit (Orangensaft oder Wasser) eingenommen werden.

Lassen Sie bei einem Arztbesuch durch die Untersuchung der Blutwerte (Hb-Wert und Serum-Ferritin) feststellen, ob die Eisentherapie erfolgreich war. Erst wenn der Serum-Ferritin-Wert wieder normal ist, gilt der Eisenmangel als vollständig behoben.

Das ferro sanol® Programm

1 Kapsel = 50 mg Eisen



Wirkstoff: Eisen(II)
20 Kapseln



ferro sanol®
duodenal

Wirkstoff: Eisen(II)-glycin-sulfat-Komplex

20 Kapseln N1

Gegen Eisenmangel mit und ohne Anämie



1 Kapsel = 100 mg Eisen

1 Kapsel = 80 mg Eisen
1 mg Folsäure



20 Kapseln N1

Zur Behandlung eines kombinierten Eisen- und Folsäuremangels, insbesondere während Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Fehl- und Mangelernährung



20 Tropfen = 30 mg Eisen



z.B. für Frühchen, Säuglinge
und Kleinkinder



Wirkstoffe: Eisen(II)-glycin-sulfat-Komplex,
Folsäure, Vitamin B12

20 Kapseln N1



1 Kapsel = 30,0 mg Eisen
0,5 mg Folsäure
2,5 µg Vitamin B₁₂



Wirkstoff: Eisen(II)-glycin-sulfat-Komplex

Zur Therapie aller Eisenmangelzustände, besonders von Eisenmangelanämien.



1 Dragée = 40 mg Eisen



SANOL